

بررسی اثر تاریخ کاشت بر رشد، فنولوژی و عملکرد ارقام بهاره کلزا

ولی الله رامنه

دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
پست الکترونیک نویسنده مسئول: vrameeh@gmail.com
(تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱۲/۱۹؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۹/۹)

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات فنولوژیکی، ارتفاع بوته و عملکرد دانه ارقام کلزای بهاره، آزمایشی در قالب طرح کرت‌های خرد شده با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات زراعی بایع کلا در طی دو سال زراعی انجام شد. پنج تاریخ کاشت شامل ۷، ۱۷، ۲۷ مهر، ۷ و ۱۷ آبان بعنوان فاکتور اصلی و ارقام RGS00 و Option500، Hyola401 و Option500 بعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. کلیه خصوصیات مورد بررسی تحت تأثیر معنی دار تاریخ کاشت و رقم قرار گرفتند. میانگین عملکرد ارقام Hyola401 و Option500 به ترتیب برابر ۳۲۷۴ و ۲۸۹۸ کیلوگرم در هکتار بود که ارقام Option500 و RGS003 به ترتیب ۳۰۴۰ و ۲۸۹۸ کیلوگرم در هکتار بود. عدم معنی دار بودن اثر متقابل تاریخ کاشت × رقم برای عملکرد دانه مبین آن است که کاهش عملکرد دانه ارقام ناشی از تأخیر در تاریخ‌های کاشت از روند مشابهی برخوردار بوده است به طوری که در تمامی تاریخ‌های کاشت مورد بررسی Option500 و Hyola401 از بیشترین و کمترین میزان عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. کاهش عملکرد دانه در تاریخ‌های کاشت انتهایی به علت عدم رشد رویشی کافی قبل از وارد شدن به مرحله گلدهی می‌باشد. همبستگی مثبت و معنی دار ارتفاع بوته و تعداد خورجین در بوته سبب گردید که کاهش ارتفاع بوته، کاهش تعداد خورجین در بوته را در تاریخ‌های کاشت انتهایی به دنبال داشته باشد، که در نهایت منجر به کاهش عملکرد دانه گردید.

واژه‌های کلیدی: خصوصیات فنولوژیکی، خورجین، کلزای بهاره، عملکرد دانه

عملکرد دانه برشمردند. پاولیستا^۷ و همکاران (۲۰۱۳) در مطالعه گونه های براسیکا به این نتیجه رسیدند که تأخیر در تاریخ کاشت باعث تسريع در زمان گلدهی و کاهش دوره گلدهی تا رسیدگی شد. در همین مطالعه واریته های دیررس با تأخیر در تاریخ کاشت عملکرد بیشتری از واریته های زودرس و متوسط رس نشان دادند. شیرانی راد و احمدی (۱۳۷۶) گزارش نمودند که تأخیر در تاریخ کاشت کاهش عملکرد دانه ارقام مورد بررسی را بدنبال داشته است. در این بررسی تأخیر در کاشت منجر به کاهش چشمگیر ارتفاع بوته و تعداد خورجین در بوته گردید. در مطالعه فرجی (۱۳۸۹) در خصوص چگونگی اثر تاریخ کاشت بروی خصوصیات فنولوژیک و عملکرد دانه ارقام بهاره کلزا گزارش شده است که با تأخیر در تاریخ کاشت خصوصیاتی از قبیل روز تا شروع گلدهی، طول دوره گلدهی و عملکرد دانه به طور معنی داری کاهش می یابد. آدامسن^۸ و کوفلت (۲۰۰۵) با بررسی اثر تاریخ کاشت بر مراحل رشد و نمو کلزا بهاره گزارش نمودند که با تأخیر در تاریخ کاشت، زمان مورد نیاز برای رشد رویشی و زایشی کوتاه تر شده و این امر منجر به کاهش عملکرد دانه می شود. مندهام و همکاران (۱۹۹۱) گزارش نمودند که با تأخیر در تاریخ کاشت سرعت نمو افزایش یافته و تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی کاهش می یابد. میرز^۹ و همکاران (۱۹۸۲) نمودند که زمان گردد افشاری با تأخیر در تاریخ کاشت تسریع می شود. این امر به دلیل اثر روزهای کوتاه بر تبدیل جوانه رویشی به زایشی است که باعث تسريع نمو آنها می شود. تأخیر در تاریخ کاشت باعث تسريع گلدهی و کاهش تعداد روز تا گلدهی و کاهش زمان گلدهی تا رسیدگی در ارقام مختلف کلزا گردید (لتون^{۱۰}، ۱۹۹۵؛ کورمی و کالتا^{۱۱}، ۱۹۹۲؛ توبه و همکاران، ۲۰۱۳). کورمی و کالتا^{۱۲} (۱۹۹۲) بیان کردند که تاریخ ظهور اولین گل یا طول دوره رویشی تعیین کننده زمان رسیدگی است. به طوری که هر چه این مدت طولانی تر

- 7- Pavlista
- 8- Adamsen
- 9- Myers
- 10-Leto
- 11- Kurmi and Kalta

مقدمه

کلیه فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه تحت تأثیر طول روز، درجه حرارت و دیگر عوامل محیطی است که تمامی موارد مجبور تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار می گیرند که ماحصل آن تأثیر بر خصوصیات مرتبط عملکرد دانه می باشد (خواجه پور، ۱۳۷۱؛ عزیزی و همکاران، ۱۳۷۸) برداشت به موقع جهت فراهم سازی فرصت مناسب برای کشت دوم، تحمل به تنש های زنده وغیر زنده، تحمل به رس و کودپذیری از عوامل عمده ای محسوب می شوند که بطور عمده ای تحت تأثیر تاریخ کاشت می باشند (حجازی ۱۳۷۹). پتانسیل عملکرد کلزا در زمان گلدهی تعیین می شود که میان رابطه بین رشد رویشی قبل از مرحله گلدهی، پتانسیل تعداد گل و اجزای عملکرد دانه می باشد (ملازم^۱ و همکاران، ۲۰۱۳؛ میری و باقری، ۲۰۱۳). زمان وقوع مراحل نموی برای تطبیق ژنتیک و محیط اهمیت حیاتی دارد و این بدین معنی است که چنانچه وقوع عوامل نامساعد مثل یخband و خشکی در فاصله بین گلدهی و رسیدگی به حداقل برسد و عوامل مساعد نظیر شرایط مطلوب تشعشع، دما و رطوبت برای رشد خورجین و دانه در حداقل باشد این تطبیق موفقیت آمیز است مندهام^۲ و همکاران (۱۹۹۱). تأخیر در کشت کلزا موجب می شود که دوره رسیدگی گیاه با دمای بالای محیط مواجه شده و این امر باعث افزایش میزان تنفس خورجین ها می شود که در نتیجه کاهش ذخیره مواد فتوسنتری و کاهش وزن دانه ها و در نهایت کاهش عملکرد بوته را به دنبال خواهد داشت (وایتفیلد، ۱۹۹۲؛ جانسون^۳ و همکاران، ۱۹۹۵؛ راپاک^۴، ۲۰۰۲؛ گان^۵ و همکاران، ۲۰۰۴). رفیعی و همکاران (۲۰۱۳) با بررسی ارقام در تاریخ ها و تراکم های مختلف، تأخیر در تاریخ کاشت را از عوامل عمدۀ کاهش اجزای عملکرد و

- 1- Molazem
- 2- Menham
- 3- Whitfield
- 4- Johnson
- 5- Rapacz
- 6- Gan

شهرستان نکاء واقع شده و فاصله آن از مرکز استان ۳۵ کیلومتر است. ارتفاع محل آزمایش از سطح دریا ۱۵ متر، طول جغرافیایی آن ۵۳ درجه و ۱۳ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی آن ۴۳ درجه و ۳۶ دقیقه شمالی می‌باشد. متوسط میزان بارندگی، درجه حرارت و رطوبت نسبی در ماههای رشد کلزا در دو سال آزمایش در جدول ۱ درج شده است. جهت فراهم شدن بستر یکنواخت زراعت سال قبل گندم بوده است. عملیات تهیه بستر شامل شخم عمیق در اوایل تابستان و سپس جهت نرم کردن خاک و خرد کردن کلوخه‌های آن پس از بارندگی و گاورو شدن از دو دیسک عمود برهم و برای تسطیح آن از ماله استفاده گردید. میزان کود مصرفی براساس آزمون خاک به مقدار ۵۰ کیلوگرم سوپر فسفات تریپل و ۱۰۰ کیلوگرم سولفات پتابسیم و مصرف نیتروژن به میزان ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار (از منبع کود اوره با ۴۶ درصد نیتروژن) بوده است. تقسیط نیتروژن به صورت یک سوم در زمان کاشت، یک سوم در زمان خروج از مرحله روزت و یک سوم نیز در زمان ساقه رفتن مورد استفاده قرار گرفت. در این بررسی پنج تاریخ کاشت از مهر ماه به فواصل ۱۰ روز D1: ۷ مهر، D2: ۱۷ مهر، D3: ۲۷ مهر، D4: ۷ آبان، D5: ۱۷ آبان در کرت اصلی و ارقام شامل: V1: Hyola401، V2: Option500 و V3: RGS003 به عنوان فاکتور فرعی مورد مطالعه قرار گرفتند. هر کرت آزمایشی شامل ۴ خط ۵ متری به فواصل ۳۰ سانتیمتر بوده است. در طی مراحل رشد از خصوصیات فنولوژیکی شامل تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی، تعداد روز تا خاتمه گلدهی ساقه اصلی بوته‌های هرکرت و تعداد روز تا رسیدگی یادداشت برداری به عمل آمد. ارتفاع گیاه و تعداد خورجین در بوته از میانگین ۱۰ بوته منتخب تصادفی از دو خط وسط با رعایت حاشیه از ابتدا و انتهای هر کرت اندازه‌گیری شد. عملکرد دانه نیز از دو خط وسط پس از حذف اثرات حاشیه‌ای بوته‌های ابتدا و انتهای هر کرت محاسبه گردید و سپس بر حسب کیلوگرم در هکتار تعیین داده شد. تجزیه واریانس صفات مورد بررسی با نرم افزار MSTAT-C و مقایسه میانگین برای عملکرد دانه به روش آزمون چند دامنه‌ای دانکن صورت پذیرفت.

باشد طول دوره‌های بعدی (زایشی تا رسیدگی) کوتاه‌تر می‌شود و کوتاه‌تر شدن فاز زایشی سبب کاهش عملکرد می‌گردد. در برخی موارد تأخیر در تاریخ کاشت منجر به برخورد دوره گلدهی کلزا با درجه حرارت نامناسب و طغیان آفات خسارت زا در مرحله گلدهی می‌گردد. در ضمن حرارت خیلی زیاد و توأم با کاهش رطوبت باعث پژمردگی غنچه‌های گل و کاهش اجزای مؤثر بر عملکرد می‌گردد. با این حال بعد از تشکیل خورجین‌ها حساسیت کلزا به دمای بالا تعدیل شده و تحمل گیاه بالا می‌رود (راپاک، ۲۰۰۲). رزمی (۱۳۸۸) با بررسی اثر تاریخ کاشت ارقام اصلاح شده کلزا در معان گزارش نمود که با تأخیر در کاشت روز تا شروع گلدهی، طول دوره گلدهی و روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته و عملکرد دانه کاهش یافت. همچنین در این بررسی اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم معنی‌دار بود. وجود اثرات متقابل معنی‌دار بین تاریخ کاشت و ژنتیک موردنده مطالعه و همچنین اثرات متقابل آن با محیط (سال و مکان) از جمله مواردی است که بررسی اثرات تاریخ کاشت را برای ارقام اصلاح شده امری الزامی می‌سازد. در این راستا بررسی اثرات تاریخ کاشت برروی خصوصیات زراعی ارقام بهاره کلزا، تعیین بهترین تاریخ کاشت و همچنین بررسی اثرات متقابل تاریخ × رقم برخصوصیات فنولوژیکی، ارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوته و عملکرد دانه در شرایط اقلیمی استان مازندران و همچنین برهم‌کنش این صفات و تأثیر نهایی آن‌ها بر عملکرد دانه مد نظر می‌باشد.

مواد و روش‌ها

در راستای بررسی اثرات تاریخ کاشت برخصوصیات فنولوژیکی، ارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوته و عملکرد دانه ارقام بهاره کلزا (این گروه از ارقام از نظر ژنتیکی بهاره محسوب شده و نیاز چندانی به بهاره‌سازی ندارند و کشت آن‌ها در مناطق گرم و سواحل خزر در پاییز صورت می‌گیرد)، آزمایشی در قالب طرح کرت‌های خرد شده با چهار تکرار در طی دو سال زراعی ۱۳۸۵-۸۶ و ۱۳۸۶-۸۷ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بایع مازندران اجرا شد. این ایستگاه در ۱۰ کیلومتری شمال

گردید.

در ضمن همبستگی صفات نیز با نرم افزار SAS و بر روی میانگین‌های اثر متقابل تاریخ کاشت × رقم محاسبه

جدول ۱- آمار هواشناسی ایستگاه تحقیقات کشاورزی بایع کلا در ماه های رشد کلزا در دو سال زراعی (۱۳۸۵-۸۷)

		میانگین بارندگی (میلیمتر)		میانگین دما (سانتی گراد)		ماه
درصد رطوبت نسبی	۱۳۸۵-۸۶	۱۳۸۶-۸۷	۱۳۸۵-۸۶	۱۳۸۶-۸۷	۱۳۸۵-۸۶	۱۳۸۶-۸۷
۷۹/۸	۸۱/۳	۵۱/۵	۱۰۴	۱۸/۵	۱۹/۸	مهر
۸۳/۵	۸۴/۶	۱۵۱/۵	۱۵۵	۱۴/۱	۱۳/۳	آبان
۸۵/۱	۸۵/۵	۱۷۶/۵	۴۴	۸/۷	۱۰/۸	آذر
۸۲/۰	۸۶/۳	۳۲/۸	۱۷۶	۹/۰	۶/۵	دی
۷۵/۵	۸۲/۱	۱۱/۳	۲۸	۱۰/۲	۶/۷	بهمن
۸۳/۴	۸۰/۹	۶۹/۹	۵۸	۱۲/۷	۱۱/۳	اسفند
۸۲/۵	۷۷/۳	۱۲۷/۸	۲۵/۲	۱۳/۸	۱۲/۶	فروردین
۷۸/۲	۷۵/۰	۳۵/۲	۴۹/۱	۱۹/۴	۲۰/۳	اردیبهشت
۷۴/۱	۷۵/۱	۴۴/۵	۱۳/۵	۲۴/۸	۲۴/۳	خرداد

در بین ارقام مورد بررسی Hyola401 و Option500 به ترتیب با برخورداری از میانگین‌های ۱۰۱/۱ و ۱۲۴/۵۰ روز از کمترین و بیشترین میزان تعداد روز تا شروع گلدهی برخوردار بودند. اثر متقابل تاریخ کاشت × رقم برای این صفت معنی دار بود (جدول ۳)، به طوری که در تاریخ کاشتهای چهارم و پنجم فاصله ارقام از نظر تعداد روز تا شروع گلدهی کمتر شد. با وجود این در تمامی تاریخ‌های کاشت Option500 و Hyola401 به ترتیب از کمترین و بیشترین میزان این صفت برخوردار بودند. اثر متقابل سال × تاریخ کاشت و اثر متقابل سال × رقم (جدول ۴) برای این صفت معنی دار بوده است و لیکن رتبه ارقام از نظر مقدار این صفت تحت تأثیر اثرات متقابل فوق الذکر قرار نگرفت. همبستگی این صفت با عملکرد دانه به صورت منفی و معنی دار (-0.72^{**}) بوده است (جدول ۵) که نشان دهنده آن است کاهش این صفت در تاریخ کاشتهای اولیه و همچنین در ژنتیک‌های زودرس منجر به افزایش عملکرد دانه گردید.

تعداد روز تا پایان گلدهی تحت تأثیر معنی دار اثر سال، تاریخ کاشت، رقم و اثرات متقابل تاریخ کاشت × رقم، سال × رقم و سال × تاریخ کاشت × رقم قرار گرفته است (جدول ۲). بیشترین مقدار این صفت (۱۷۰/۸۰) آن مربوط به تاریخ کاشت اول و کمترین مقدار (۱۵۲/۶۰) آن نیز در تاریخ کاشت پنجم مشاهده شد. تنوع این صفت

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس مرکب داده‌های دو سال نشان داد که اثر سال برای تعداد روز تا پایان گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی و ارتفاع بوته معنی دار بوده است ولی تعداد روز تا شروع گلدهی، تعداد خورجین در بوته و عملکرد دانه تحت تأثیر معنی دار سال قرار نگرفت (جدول ۲). اثر تاریخ کاشت برای کلیه خصوصیات مورد مطالعه معنی دار گردید. مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که با تأخیر در تاریخ کاشت بر تعداد روز تا شروع گلدهی افزوده شده است، به طوری که تاریخ کاشت های ۷ و ۱۷ آبان ماه از بیشترین مقدار آن برخوردار بودند. درجه حرارت بالا از عمدۀ دلیل تأمین درجه روز رشد مورد نیاز و تسريع گلدهی در تاریخ کاشتهای اولیه و کاهش تعداد روز تا شروع گلدهی بوده است و این خاص شرایط اقلیمی استان مازندران و دیگر استان هایی است که ارقام تیپ بهاره در آنها کشت می شود. مندهام و همکاران (۱۹۹۱) گزارش نمودند که با تأخیر در تاریخ کاشت سرعت نمو افزایش یافته و تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی کاهش یافت. رزمی (۱۳۸۸) با بررسی اثر تاریخ کاشت ارقام اصلاح شده کلزا در مغان گزارش نمود که با تأخیر در کاشت تعداد روز تا شروع گلدهی به طور معنی داری کاهش یافت.

رشدی ضعیفتر و همچنین ارتفاع بوته کمتر وارد مرحله گلدهی گردیده که در نتیجه کاهش عملکرد دانه را نیز به دنبال داشته است.. همبستگی این صفت با عملکرد دانه (۰/۵۲*) بوده است که نشان دهنده آن است که در تاریخ کاشت‌های اولیه افزایش ارتفاع بوته ارقام دربرگیرنده اجزای عملکرد دانه بیشتری بوده است که در نهایت منجر به افزایش عملکرد دانه شده است. در بین ارقام مورد بررسی RGS003 و Hyola401 به ترتیب با ارتفاع بوته ۱۵۳/۸ و ۱۳۵/۵ سانتی‌متر بیشترین و کمترین میزان ارتفاع بوته را به خود اختصاص داده اند. عدم معنی دار بودن اثر متقابل تاریخ کاشت × رقم برای این صفت حاکی از این است که تغییرات ارتفاع بوته در ارقام مورد بررسی در تمامی تاریخ‌های کاشت از روند مشابهی برخوردار بوده است، به طوری که در تمامی تاریخ‌های کاشت در پنجم (۱۳۸۸) با بررسی اثر تاریخ کاشت ارقام اصلاح شده کلزا در مغان گزارش نمود که با تأخیر در کاشت ارتفاع بوته و عملکرد دانه کاهش یافت. در خصوص عدم معنی دار بودن اثر متقابل سال × تاریخ کاشت نشان دهنده آن است که در هر دو سال متوالی تاریخ کاشت‌های مورد بررسی روند مشابهی از نظر کاهش ارتفاع بوته در تاریخ کاشت‌های انتهایی داشته‌اند.

تعداد خورجین در بوته به عنوان مهمترین جزء عملکرد دانه تحت تأثیر معنی دار تاریخ کاشت قرار گرفت (جدول ۲) و میزان آن نیز با تأخیر در تاریخ کاشت روند کاهش داشته است (جدول ۳). میانگین این صفت در تاریخ کاشت پنجم نسبت به تاریخ کاشت اول حدود ۵۴ درصد کاهش یافته است و همچنین مقادیر آن در پنج تاریخ مورد بررسی از نظر آماری به سه کلاس متمايز تفکیک شده است. در بین ارقام مورد بررسی بیشترین مقدار آن مربوط به RGS003 بوده است که از نظر آماری با Hyola401 در یک کلاس آماری قرار گرفته است. همبستگی این صفت با عملکرد دانه به صورت مثبت و معنی دار تجلی یافته است که میان اثرات معنی دار تغییرات این صفت بر عملکرد دانه می‌باشد (جدول ۵).

نسبت تعداد روز تا شروع گلدهی در ارقام مورد بررسی کاهش یافت و بیشترین (۱۶۵/۷۰ روز) مقدار این صفت مربوط به Option500 و کمترین مقدار این صفت مربوط به Hyola401 (۱۵۸/۹۰ روز) مربوط به ۱۹۸۲ (همکاران) در آزمایشات مزرعه ای روی کلزا گزارش نمودند که زمان گردهافشانی با تأخیر در تاریخ کاشت جلو می‌افتد. این مورد به دلیل اثر روزهای کوتاه بر تبدیل جوانه‌زنی رویشی به زایشی است که باعث تسريع نمو آن‌ها می‌شود.

تعداد روز تا رسیدگی تحت تأثیر تاریخ کاشت، رقم و اثرات متقابل تاریخ کاشت × رقم، سال × رقم و سال × تاریخ کاشت × رقم قرار گرفته است (جدول ۲). بیشترین میزان این صفت (۲۲۶/۹ روز) مربوط به تاریخ کاشت اول و کمترین مقدار این صفت (۱۹۶/۹۰ روز) مربوط به تاریخ کاشت پنجم بوده است (جدول ۳)، که دلیل عدمه آن مربوط به دمای نسبتاً متعادل مربوط به طول دوره گلدهی و پرشدن خورجین تاریخ‌های کاشت اولیه و در نتیجه منجر به افزایش تعداد روز تاریخ‌گردیده است. میزان تنوع تعداد روز تا رسیدگی در ارقام مورد بررسی نسبت به تعداد روز تا شروع گلدهی به مراتب کاهش پیدا نموده است، لذا در مواردی که میزان تنوع این صفت در ارقام مورد مطالعه کم می‌باشد از تعداد روز تا شروع گلدهی به عنوان انتخاب غیرمستقیم در جهت زودرسی ژنتیک‌ها استفاده می‌گردد. در دیگر مطالعه تأخیر در تاریخ کاشت باعث تسريع گلدهی و کاهش تعداد روز تا گلدهی و کاهش زمان گلدهی تا رسیدگی در ارقام زمستانه کلزا گردید (کورمی و کالتا^۱، ۱۹۹۲؛ توبه و همکاران، ۲۰۱۳). رزمی (۱۳۸۸) با بررسی اثر تاریخ کاشت ارقام اصلاح شده کلزا در مغان گزارش نمود که با تأخیر در کاشت طول دوره گلدهی و روز تا رسیدگی کاهش یافت. میانگین مربعات تاریخ کاشت، رقم و اثر متقابل سال × رقم برای ارتفاع بوته معنی دار بود. کاهش ارتفاع بوته با تأخیر در تاریخ کاشت محسوس بود به طوری که میزان ارتفاع بوته برای تاریخ کاشت اول و پنجم به ترتیب از ۱۶۵/۵ ۱۲۹ سانتی‌متر متغیر بود. تاریخ کاشت‌های انتهایی با بنیه

1- Myers

2-Kurmi and Kalta

در تاریخ‌های مختلف کاشت کاهش معنی‌داری یافت به طوری که میزان آن از ۳۷۱۱ کیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت اول به ۲۶۶۶ کیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت که تاریخ کاشت‌های ۷ و ۱۷ آبان ماه از بیشترین مقدار آن برخوردار بودند. درجه حرارت بالا از عدمه دلیل تأمین درجه روز رشد مورد نیاز و تسريع گله‌ی در تاریخ کاشت‌های اولیه و کاهش تعداد روز تا شروع گله‌ی بوده است. میزان عملکرد اوله در تاریخ کاشت‌های انتهایی ناشی از عدم رشد رویشی کاهش معنی‌داری یافت. عدمه دلیل کاهش عملکرد اوله در تاریخ کاشت‌های انتهایی ناشی از عدم رشد رویشی کافی قبیل از وارد شدن به مرحله گله‌ی می‌باشد. در بین ارقام مورد بررسی نیز Option500 و Hyola401 از بیشترین و کمترین میزان عملکرد اوله برخوردار بوده اند. عدم معنی دار بودن اثر متقابل تاریخ کاشت × رقم برای این صفت میان آن است که کاهش عملکرد اوله ارقام ناشی از تأخیر در تاریخ‌های کاشت از روند مشابهی برخوردار بوده است (جدول ۲)، به طوری که در تاریخ‌های کاشت مورد بررسی Option500 و Hyola401 از بیشترین و کمترین میزان عملکرد اوله را به خود اختصاص داده اند. در مطالعه فرجی (۱۳۸۹) در خصوص چگونگی اثر تاریخ کاشت بر روی خصوصیات فنولوژیکی و عملکرد اوله ارقام بهاره کلزا گزارش شده است که با تأخیر در تاریخ کاشت خصوصیاتی از قبیل روز تا شروع گله‌ی، طول دوره گله‌ی و عملکرد اوله به طور معنی‌داری کاهش یافت. آدامسن^۱ و کوفلت (۲۰۰۵) با بررسی اثر تاریخ کاشت بر مراحل رشد و نمو کلزا بهاره گزارش نمودند که با تأخیر در تاریخ کاشت، زمان مورد نیاز برای رشد رویشی و زایشی کوتاه‌تر شده و این امر منجر به کاهش عملکرد اوله گردید. به طور کلی در این بررسی اثرات متقابل سال × تاریخ کاشت و سال × رقم، سال × تاریخ کاشت × رقم برای عملکرد اوله معنی‌دار نبوده است که نشان دهنده عدم تأثیر اثرات معنی‌دار سال بر روی چگونگی تغییرات عملکرد اوله ناشی از تغییرات تاریخ کاشت و همچنین ناشی از تنوع ارقام می‌باشد. لذا محدوده تاریخ کاشت مهرماه به عنوان تاریخ کاشت مطلوب برای کشت کلزا در استان مازندران قابل توصیه می‌باشد.

تشکر و قدردانی

از مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران به خاطر تهیه منابع مالی و امکانات اجرای این طرح تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.

عملکرد اوله تحت تأثیر معنی‌دار تاریخ کاشت و رقم قرار گرفت و هیچ یک از اثرات متقابل فاکتورهای مورد بررسی برای آن معنی‌دار نشده است. میزان عملکرد اوله پنجم تقليل یافت. عدمه دلیل کاهش عملکرد اوله در تاریخ کاشت‌های انتهایی ناشی از عدم رشد رویشی کافی قبل از وارد شدن به مرحله گله‌ی می‌باشد. در بین ارقام مورد بررسی نیز Option500 و Hyola401 از بیشترین و کمترین میزان عملکرد اوله در تاریخ کاشت × رقم برای این صفت میان آن است که کاهش عملکرد اوله ارقام ناشی از تأخیر در تاریخ‌های کاشت از روند مشابهی برخوردار بوده است (جدول ۲)، به طوری که در تاریخ‌های کاشت مورد بررسی Option500 و Hyola401 از بیشترین و کمترین میزان عملکرد اوله را به خود اختصاص داده اند. در مطالعه فرجی (۱۳۸۹) در خصوص چگونگی اثر تاریخ کاشت بر روی خصوصیات فنولوژیکی و عملکرد اوله ارقام بهاره کلزا گزارش شده است که با تأخیر در تاریخ کاشت خصوصیاتی از قبیل روز تا شروع گله‌ی، طول دوره گله‌ی و عملکرد اوله به طور معنی‌داری کاهش یافت. آدامسن^۱ و کوفلت (۲۰۰۵) با بررسی اثر تاریخ کاشت بر مراحل رشد و نمو کلزا بهاره گزارش نمودند که با تأخیر در تاریخ کاشت، زمان مورد نیاز برای رشد رویشی و زایشی کوتاه‌تر شده و این امر منجر به کاهش عملکرد اوله گردید. به طور کلی در این بررسی اثرات متقابل سال × تاریخ کاشت و سال × رقم، سال × تاریخ کاشت × رقم برای عملکرد اوله معنی‌دار نبوده است که نشان دهنده عدم تأثیر اثرات معنی‌دار سال بر روی چگونگی تغییرات عملکرد اوله ناشی از تغییرات تاریخ کاشت و همچنین ناشی از تنوع ارقام می‌باشد. لذا محدوده تاریخ کاشت مهرماه به عنوان تاریخ کاشت مطلوب برای کشت کلزا در استان مازندران قابل توصیه می‌باشد.

نتیجه‌گیری کلی

خصوصیات فنولوژیکی تحت تأثیر معنی‌دار تاریخ معنی‌دار قرار گرفت. در این راستا با تأخیر در تاریخ کاشت بر تعداد روز تا شروع گله‌ی افزوده شده است، به طوری

جدول ۲- تجزیه واریانس مرکب برای خصوصیات فنولوژیکی، ارتفاع بوته و عملکرد دانه.

میانگین مربوطات							منابع تغییرات	درجه آزادی
		روز تا پایان گلدهی	روز شروع گلدهی	تعداد خورجین در بوته	ارتفاع بوته	روز تا رسیدگی	عملکرد دانه بوته	
۱۷۸۰۸۵۸	۹۶۰	۵۷۵۱/۶**	۲۹۳۰/۴**	۷۰۵۳/۱**	۲/۱	۱	سال	
۳۹۸۳۸۲	۷۹۷	۱۲۳/۶	۰/۵	۰/۲	۴/۴	۶	تکرار در سال	
۳۶۱۸۷۸۳**	۳۰۰۳۶**	۴۸۵۵/۴**	۳۲۵۹/۷**	۱۰۷۸/۵**	۳۵۵۹/۶**	۴	تاریخ کاشت	
۲۱۸۸۳۸	۹۲۴۹**	۱۱۵/۴	۳۴/۶**	۲۵۵/۸**	۲۷۴/۵**	۴	سال × تاریخ کاشت	
۳۹۰۲۶۴	۶۱۴	۹۵/۴	۰/۲	۰/۲	۳/۱	۲۴	خطای الف	
۷۷۹۶۹۵۲**	۲۳۳۸*	۳۸۴۳/۳**	۲۸۵/۲**	۵۰۴/۳**	۶۷۱۵/۱**	۲	رقم	
۶۱۹۵۹۰	۱۰۵۰	۷۱۴/۲**	۱۸۴/۸**	۶۴/۹**	۲۸۵/۱**	۲	سال × رقم	
۲۹۰۷۱۹	۵۴۳	۱۰۹/۴	۵۲/۲**	۶۵/۳**	۷۰۷/۵**	۸	تاریخ کاشت × رقم	
۲۱۷۷۹۵	۱۷۱۷**	۱۱۳/۶	۳۷/۷**	۳۰/۱**	۳۲/۴**	۸	سال × تاریخ کاشت × رقم	
۲۰۱۶۴۳	۵۰۷	۴۴/۴	۰/۳	۰/۶	۲/۸	۶۰	خطای (ب)	
۱۳/۹۴	۱۵/۸۵	۶/۵۴	۳/۲۶	۰/۴۹	۱/۵۵		CV (%)	

* و ** به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال ۵ و ۱ درصد و بدون علامت غیر معنی دار

جدول ۳- مقایسه میانگین تاریخ کاشت، رقم و تاریخ کاشت × رقم برای خصوصیات مختلف.

تیمار	روز تا شروع گلدهی	روز تا پایان گلدهی	ارتفاع بوته (سانتی متر)	تعداد خورجین در بوته	عملکرد دانه (کیلو گرم در هکتار)
تاریخ کاشت					
۳۷۱۱ a	۱۷۰/۸۰ a	۲۲۶/۹۰ a	۱۶۵/۵۰ a	۱۸۳/۱۵ a	۳۷۱۱ a
۳۲۲۸ b	۱۶۵/۵۰ b	۲۱۵/۴۰ b	۱۵۴/۷۰ b	۱۶۲/۷۶ b	۳۲۲۸ b
۳۴۰۵ ab	۱۶۰/۸۰ c	۲۰۵/۹۰ c	۱۴۶/۶۰ c	۱۵۱/۳۲ b	۳۴۰۵ ab
۳۱۰۰ b	۱۶۱/۰۰ c	۲۰۳/۷۰ d	۱۳۷/۸۰ d	۱۱۱/۳۷ c	۳۱۰۰ b
۲۶۶۰ c	۱۵۲/۶۰ d	۱۹۶/۹۰ e	۱۲۹/۰۰ e	۹۸/۹۰ c	۲۶۶۰ c
رقم					
۳۷۲۴ a	۱۵۸/۶۰ c	۲۰۸/۷۰ b	۱۳۵/۵۰ b	۱۳۸/۸۰ ab	۳۷۲۴ a
۲۸۹۸ b	۱۶۵/۷۰ a	۲۱۲/۸۰ a	۱۵۰/۸۰ a	۱۳۵/۵۷ b	۲۸۹۸ b
۳۰۴۰ b	۱۶۲/۱۰ b	۲۰۷/۸۰ c	۱۵۳/۸۰ a	۱۵۰/۱۳ a	۳۰۴۰ b
تاریخ کاشت × رقم					
۴۳۹۱ a	۱۶۶/۵۰ d	۲۳۱/۰۰ a	۱۵۲/۸۰ bc	۱۸۳/۲۵ ab	۴۳۹۱ a
۲۲۱۴ ab	۱۷۷/۰۰ a	۲۲۷/۴۰ b	۱۷۱/۶۰ a	۱۷۳/۲۵ abc	۲۲۱۴ ab
۳۵۲۷ ab	۱۶۸/۸۰ c	۲۲۲/۴۰ c	۱۷۲/۱۰ a	۱۹۲/۹۶ a	۳۵۲۷ ab
۳۴۸۲ ab	۱۶۲/۵۰ g	۲۱۳/۴۰ e	۱۵۰/۶۰ bcd	۱۶۴/۳۴ bcd	۳۴۸۲ ab
۳۰۲۹ ab	۱۱۹/۹۰ d	۲۱۸/۹۰ d	۱۵۴/۹۰ bc	۱۴۷/۲۳ cd	۳۰۲۹ ab
۳۱۷۲ ab	۹۱/۱۳۳ g	۱۶۳/۰۰ g	۱۵۸/۶۰ b	۱۷۶/۷۳ ab	۳۱۷۲ ab
۴۰۰۲ ab	۹۹/۷۵ f	۱۵۵/۵۰ k	۱۳۵/۳۰ e	۱۴۶/۸۸ ccd	۴۰۰۲ ab
۲۹۴۰ ab	۱۲۵/۳۰ b	۱۶۵/۵۰ e	۱۵۱/۱۰ bc	۱۳۹/۸۳ d	۲۹۴۰ ab
۳۲۷۷ ab	۹۸/۰۰ f	۱۶۱/۵۰ i	۱۵۳/۵۰ bc	۱۶۷/۲۴ abc	۳۲۷۷ ab
۳۶۷۷ ab	۱۱۹/۵۰ d	۱۵۶/۵۰ j	۱۲۳/۷۰ f	۱۰۶/۰۸ e	۳۶۷۷ ab
۲۷۱۹ ab	۱۲۷/۹۰ a	۱۶۲/۰۰ h	۱۴۲/۰۰ de	۱۱۴/۶۸ e	۲۷۱۹ ab
۲۹۰۴ ab	۱۲۲/۹۰ c	۱۶۴/۵۰ f	۱۴۷/۷۰ cd	۱۱۳/۳۵ e	۲۹۰۴ ab
۳۰۶۷ ab	۱۱۷/۸۰ e	۱۵۲/۰۰ m	۱۱۵/۲۰ g	۹۳/۴۸ e	۳۰۶۷ ab
۲۵۸۸ ab	۱۲۵/۴۰ b	۱۵۳/۰۰ l	۱۳۴/۷۰ e	۱۰۲/۸۵ e	۲۵۸۸ ab
۲۲۲۵ b	۱۱۹/۴۰ d	۱۵۲/۸۰ l	۱۹۵/۹۰ k	۱۰۰/۳۷ e	۲۲۲۵ b

میانگین اعداد به صورت ستونی با هم مقایسه شدند. حروف مشابه از لحاظ آماری بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن (سطح اطمینان ۰/۱) معنی‌دار نیستند.

جدول ۴- مقایسه میانگین اثر سال × رقم و سال × تاریخ کاشت برای خصوصیات مختلف.

تیمار	روز تا شروع گلدهی	روز تا پایان گلدهی	ارتفاع بوته (سانتی متر)	تعداد خورجین در بوته	عملکرد دانه (کیلو گرم در هکتار)
سال × رقم					
۳۷۲۱ a	۱۳۰/۰۷b	۱۴۱/۰۵c	۲۱۵/۰۵a	۱۵۲/۰۴ f	۱۰۱/۰۷ d
۲۸۸۳ b	۱۳۵/۰۹b	۱۶۲/۰۴a	۲۱۵/۰۴a	۱۵۷/۰۴d	۱۲۶/۰۷ a
۲۸۱۶ b	۱۵۰/۰۵a	۱۵۷/۰۰a	۲۱۳/۰۲b	۱۵۳/۰۶e	۱۰۰/۱۰ e
۳۷۲۶ a	۱۴۷/۰۵a	۱۲۹/۰۶d	۲۰۱/۰۹e	۱۶۴/۰۸c	۱۰۰/۰۶ d
۲۹۱۳ b	۱۳۵/۰۸b	۱۳۹/۰۳c	۲۱۰/۰۲c	۱۷۴/۰۰a	۱۲۲/۰۳ b
۲۲۶۴ b	۱۴۹/۰۶a	۱۵۰/۰۵b	۲۰۲/۰۴d	۱۷۰/۰۶b	۱۰۶/۰۲ c
سال × تاریخ کاشت					
۳۷۰۰ a	۱۶۵/۰۴bc	۱۷۲/۰۰a	۲۳۳/۰۷a	۱۶۰/۰۸e	۹۵/۰۵fg
۳۱۶۴abcd	۱۴۰/۰۳cd	۱۶۲/۰۱b	۲۱۹/۰۰c	۱۵۴/۰۳g	۱۰۵/۰۷e
۳۳۷۷ab	۱۴۱/۰۲cd	۱۵۵/۰۴b	۲۱۱/۰۲e	۱۵۲/۰۰h	۱۰۸/۰۳d
۲۸۵۲bcd	۱۲۶/۰۳d	۱۴۱/۰۱c	۲۰۸/۰۷f	۱۵۶/۰۷f	۱۲۱/۰۷b
۲۶۰۶d	۱۱۹/۰۳de	۱۳۷/۰۵d	۲۰۱/۰۰g	۱۴۸/۰۵i	۱۱۶/۰۱c
۳۷۲۲a	۲۰۰/۰۸a	۱۵۹/۰۰b	۲۲۰/۰۲b	۱۸۰/۰۷a	۹۳/۰۲g
۳۲۹۱abc	۱۸۵/۰۱ab	۱۴۷/۰۱c	۲۱۱/۰۸d	۱۷۶/۰۷b	۹۶/۰۲f
۳۴۳۲ab	۱۶۱/۰۴bc	۱۳۷/۰۹d	۲۰۰/۰۷g	۱۶۹/۰۷c	۱۰۷/۰۰de
۳۲۴۷ab	۹۶/۰۴ef	۱۳۴/۰۴d	۱۹۸/۰۸h	۱۶۵/۰۳d	۱۲۵/۰۲a
۲۷۱۴cd	۷۷/۰۸f	۱۲۰/۰۵e	۱۹۲/۰۸i	۱۵۶/۰۷f	۱۲۵/۰۶a
Y: Year D: Planting date V: Variety					

میانگین اعداد به صورت ستونی با هم مقایسه شدند. حروف مشابه از لحاظ آماری بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن (سطح اطمینان ۹۵٪) معنی دار نیستند.

جدول ۵- ضرایب همبستگی خصوصیات مورد مطالعه ارقام کلزا در تاریخ‌های مختلف کاشت (n=۱۵).

صفات	روز تا شروع گلدهی	روز تا خاتمه گلدهی	روز تا رسیدن	ارتفاع بوته	تعداد خورجین در بوته	عملکرد دانه
روز تا شروع گلدهی	۱					
روز تا خاتمه گلدهی	-۰/۱۴	۱				
روز تا رسیدن	-۰/۴۹	-۰/۴۹	۱			
ارتفاع بوته	-۰/۳۷	-۰/۸۷**	-۰/۸۱**	۱		
تعداد خورجین در بوته	-۰/۷۵**	-۰/۶۹**	-۰/۸۳**	-۰/۸۴**	۱	
عملکرد دانه	-۰/۷۲**	-۰/۲۱	-۰/۵۸*	-۰/۱۴	-۰/۵۸*	۱

* و ** به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال ۵ و ۱ درصد

منابع

- حجازی، ا.ا. ۱۳۷۹. تولید کانولا (کاشت، داشت و برداشت). انتشارات روزانه. ۱۵۷ صفحه.
خواجه‌پو، م.ر. ۱۳۷۱. اصول زراعت. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان. ۴۱۲ صفحه.

- رمی، ن. ۱۳۸۸ . اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ژنتیپ‌های کلزا در منطقه مغان. مجله بهزایی نهال و بذر، ۲۵(۳): ۳۱۴-۳۰۱.
- شیرانی‌راد، ا. ح. و احمدی، م. ۱۳۷۶ . اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روند رشد و عملکرد دانه دو رقم کلزای روغنی پاییزه (Brassiac napus L.) در منطقه کرج. مجله علوم کشاورزی ایران، ۲۸(۲): ۳۶-۲۷.
- عزیزی، م.، سلطانی، ا. و خاوری خراسانی، س. ۱۳۷۸ . کلزا فیزیولوژی، زراعت، بهنژادی، تکنولوژی زیستی (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ۲۳۲ صفحه.
- فرجی، ا. ۱۳۸۹ . تعیین واکنش فنولوژی ژنتیپ‌های بهاره کلزا به تاریخ کاشت، دما و فتوپریود. مجله بهزایی نهال و بذر، ۲-۲۶ . ۴۱(۱): ۲۵-۲۵.

- Adamsen, F. J., and Coffelt, T.A. 2005. Planting date effects on flowering, seed yield and oil content of rape and crambe cultivars. Industrial Crops and Products, 21(3): 293-307.
- Gan, Y., Angadi, S. V., Cutforth, H., Potts, D., Angadi, V.V., and Mc Donald, C. L. 2004. Canola and mustard response to short periods of temperature and water stress at different developmental stages. Canadian Journal of Plant Science, 84(3): 697-704.
- Johnson, B. L., Schneiter, A. A., Mckay, K.R., Hanson, B. K.,and Schatz, B.G. 1995. Influence of planting date on canola and crambe production. Journal of Production Agriculture, 8(4): 594- 599.
- Kurmi, K., and Kalta, M. M. 1992. Effect of sowing date, seed rate and method of sowing on growth, yield and oil content of rapeseed (*Brassica napus L.*). Indian Journal of Agricultural Science, 37(3):595-597.
- Leto, C., Carrubba, A., Cibella, R., and Trapani. D. 1995. Effect of sowing date and cultivar on phonology and yield of autumn sown oil seed rape (*Brassica napus L.var. oleifera*). Rivista de Agronomia, 29(1): 72-82.
- Mendham, N. J., Russell, J., and Jarosz, J. 1991. Response to sowing time of three contrasting Australian cultivars of oil-seed rape (*Brassica napus*, L.). Journal of Agricultural Science Cambridge, 114: 275-283.
- Miri, Y., and Bagheri, H. 2013. Evaluation Planting Date on Agronomical Traits of Canola (*Brassica napus L.*). International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4(3): 601-603.
- Molazem, D., Azimi, J., Ghasemi, M., Hanifi, M. and Khatami, A. 2013. Correlation analysis in different planting dates and plant density of canola (*Brassica napus L.*) varieties in Astara Region. Life Science Journal, 10(1): 26-31.
- Myers, L. F., Chistian, K. R., and Kirchner, R. J. 1982. Flowering responses of 48 lines of oilseed (*Brassica sp.*) to vernalization and day length. Crop and Pasture Science, 33(6): 927-936.
- Pavlista, A.D., Isbell, T.A., Baltensperger, D.D., and Hergerta, G.W. 2011. Planting date and development of spring-seeded irrigated canola,brown mustard and camelina. Industrial Crops and Products, 33(2): 451-456.
- Rafiei, S., Delkhosh, B., Shirani Rad, A.H., and Zandi, P. 2011. Effect of sowing dates and irrigation regimes on agronomic traits of Indian mustard in semi-arid area of Takestan. Journal of American Science, 7(10): 721-728.
- Rapacz, M. 2002. Cold-declamation of oilseed rape (*Brassica nupus L. var. Oleifera*) in response to temperatures and photoperiod. Agronomy Journal, 191: 130-137.
- Tobe, A., Hokmalipour, S., Jafarzadeh, B., and Hamele Darbandi, M. 2013. Effect of sowing date on some phenological stages and oil contents in spring canola (*Brassica napus*, L.) cultivars. Middle-East. Journal of Scientific Research, 13 (9): 1202-1212. در متن نیست.
- Whitfield, D.M. 1992. Effect of temperature and ageing on co₂ exchange of pods of oil-seed rape. Field Crop Research, 28(4): 305-313.

Evaluation of planting dates effects on growth, phenology and seed yield of spring rapeseed varieties

Valiollah Rameeh

Agricultural and Natural Resources Research Center of Mazandaran

Corresponding Author E-mail: vrameeh@gmail.com

(Received: 2014/03/10 - Accepted: 2014/11/30)

Abstract

In order to evaluate the effect of planting dates on phenological traits, plant height, pods per plant and seed yield of rapeseed spring varieties, a split-split plot experiment based on randomized complete block design with four replications was conducted during 2 years at Agriculture Research Station of Baykola, Mazandaran, Iran. Treatments were planting dates (September 29, October 9, October 19, October 29 and November 8) as main plot and sub-plots were three cultivars (Hyola401, Option500 and RGS003. All the traits were affected by planting date and variety. The mean values of seed yield of Hyola401, Option500 and RGS003 were 3274, 2898 and 3040 kg ha⁻¹, respectively and Option500 and RGS003 had not statistically significant difference. Non significant interaction effects of planting dates and varieties for seed yield indicated that yield reduction of the varieties in late planting dates had similar trend and Hyola401 and Option500 had the most and the least seed yield, respectively. Seed yield reduction at late planting date was related to insufficient vegetative growth before flowering stage. Significant positive correlation between plant height and number of pods per plant was the main reason that in late planting date reduction of plant height imposed reduction of pods per plant and finally seed yield was decreased.

Key words: *Phenological traits, Pod, Seed yield, Spring rapeseed*